



RESUMEN CLIMATOLÓGICO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO

En esta primera quincena del mes de junio cabe distinguir dos períodos de muy distintas características, de forma que si bien la primera semana del mes resultó bastante cálida, con temperaturas máximas que superaron los 35° C en áreas de Andalucía, Extremadura y sur de Castilla la Mancha y con escasas precipitaciones, que afectaron principalmente al interior del cuadrante nordeste peninsular, a partir del día 8 cambió de forma radical la situación meteorológica, registrándose precipitaciones, en algunos casos de fuerte intensidad, en todas las regiones excepto en Canarias, Baleares y algunas zonas puntos del extremo sureste peninsular. Por otro lado, las temperaturas descendieron apreciablemente y de forma brusca, situándose claramente por debajo de los valores normales para mediados de junio.

Como se puede apreciar en el mapa que se adjunta las precipitaciones más importantes se han registrado en Galicia, regiones de la vertiente cantábrica y área de Pirineo, siendo especialmente copiosas y persistentes en una zona que abarca el extremo nordeste de Galicia y el centro y este de Asturias, zona donde entre los días 9 y 11 se acumularon importantes cantidades de precipitación, que en algunos puntos superaron los 300 mm, con registros locales en 24 horas próximos a los 200 mm.

Por lo que respecta a las temperaturas de esta primera mitad de junio, pese al descenso de los últimos días se mantienen en promedio en torno a 1° C por encima de su valor normal para este período.

